

รายการยาสำหรับเฝ้าระวังการแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน หรือแพ้ยาข้ามกลุ่มที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกัน

Beta-lactams	Cephalosporins	Sulfonamide
<p>Penicillins</p> <ul style="list-style-type: none"> Amoxicillin capsule* Amoxicillin + Clavulanate tab, dry susp. (Augmentin®)* Ampicillin inj.* Ampicillin + sulbactam inj.(Unasyn®) Benzathine Penicillin inj.* Cloxacillin inj.* Dicloxacillin cap, dry susp.* Penicillins V tab, dry susp.* Penicillin G inj.* <p>Cephalosporins ดูรายละเอียดในช่องถัดไป</p> <p>Carbapenems</p> <ul style="list-style-type: none"> Imipenem Meropenem Ertapenem Doripenem 	<p>Same 7 – position side chains</p> <p><u>กลุ่มที่1</u> Cefoxitin, Cephalothin, Penicillin G*</p> <p><u>กลุ่มที่2</u> Cefaclor, Cephadrine, Cephalexin*, Cefadroxil, Amoxicillin*, Ampicillin*</p> <p><u>กลุ่มที่3</u> Cefepime, Ceftizoxime, Cefpirome, Cefotaxime*, Cefpodoxime, Ceftriaxone*</p> <p>Same 3 – position side chains</p> <p><u>กลุ่มที่1</u> Cefadroxil, Cephalexin*</p> <p><u>กลุ่มที่2</u> Cefmetazole, Cefoperazone, Cefotetan</p> <p><u>กลุ่มที่3</u> Cefotaxime*, Cephalothin</p> <p><u>กลุ่มที่4</u> Ceftibuten, Ceftizoxime</p> <p><u>กลุ่มที่5</u> Cefuroxime, Cefoxitin</p> <p><u>กลุ่มที่6</u> Cefdinir*, Cefixime*</p>	<p>Antibiotics</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulfamethoxazole (Bactrim®)* Dapsone* Sulfadiazine Sulfacetamide <p>Non – antibiotics</p> <ul style="list-style-type: none"> Furosemide (lasix®)* Bumetanide Chlorthalidone Hydrochlorothiazide* Chlorothiazide Indapamide Metolazone Acetohexamide Chlorpropamide Glipizide* Glicazide Glimepiride Glibenclamide* Tolbutamide Sulfasalazine* Probenacid Celecoxib Sumatriptan Naratriptan Topiramate Ibutilide Sotalol <p>หมายเหตุ กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยา antibiotic ในกลุ่ม sulfonamide อาจพิจารณาใช้ยา non – antibiotic ในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากอาการแพ้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้าง arylamine ที่ไม่มีอยู่ในกลุ่ม non - antibiotics</p>
NSAIDs	Quinolones	
<p>Salicylates</p> <ul style="list-style-type: none"> Aspirin*, Diflunisal <p>Propionic acid derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibuprofen*, Naproxen*, Fenoprofen <p>Acetic acid derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> Indomethacin*, Sulindac, Diclofenac* <p>Enolic acid (Oxicam) derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> Piroxicam*, Meloxicam, Tenoxicam <p>Fenamic acid derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefenamic acid*, Flufenamic acid <p>Sulphonanilides</p> <ul style="list-style-type: none"> Nimesulide <p>Selective Cox – 2 inhibitors (Coxibs)</p> <ul style="list-style-type: none"> Celecoxib, Etoricoxib* 	<ul style="list-style-type: none"> Norfloxacin* Ofloxacin* Ciprofloxacin* Levofloxacin (Cravit®) Moxifloxacin (Avelox®) 	
	Anticonvulsant	
	<p>Aromatic ring contained</p> <ul style="list-style-type: none"> Phenytoin* Phenobarbital* Carbamazepine* Lamotrigine <p>หมายเหตุ ถ้าผู้ป่วยเกิดอาการ Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome (AHS) จากยาตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ ไม่ควรใช้ยาตัวใดในกลุ่มนี้อีกเลย</p>	<p>* รายการยาที่มีในบัญชียาโรงพยาบาลบางละมุง</p>