

รายการยาสำหรับเฝ้าระวังการแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน หรือแพ้ยาข้ามกลุ่มที่มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกัน

Beta-lactams	Cephalosporins	Sulfonamide
<p><b>Penicillins</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amoxicillin capsule*</li> <li>Amoxicillin + Clavulanate tab, dry susp. (Augmentin®)*</li> <li>Ampicillin inj.*</li> <li>Ampicillin + sulbactam inj.(Unasyn®)</li> <li>Benzathine Penicillin inj.*</li> <li>Cloxacillin inj.*</li> <li>Dicloxacillin cap, dry susp.*</li> <li>Penicillins V tab, dry susp.*</li> <li>Penicillin G inj.*</li> </ul> <p><b>Cephalosporins</b> ดูรายละเอียดในช่องถัดไป</p> <p><b>Carbapenems</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imipenem</li> <li>Meropenem</li> <li>Ertapenem</li> <li>Doripenem</li> </ul>	<p><b>Same 7 – position side chains</b></p> <p><u>กลุ่มที่1</u> Cefoxitin, Cephalothin, Penicillin G*</p> <p><u>กลุ่มที่2</u> Cefaclor, Cephadrine, Cephalexin*, Cefadroxil, Amoxicillin*, Ampicillin*</p> <p><u>กลุ่มที่3</u> Cefepime, Ceftizoxime, Cefpirome, Cefotaxime*, Cefpodoxime, Ceftriaxone*</p> <p><b>Same 3 – position side chains</b></p> <p><u>กลุ่มที่1</u> Cefadroxil, Cephalexin*</p> <p><u>กลุ่มที่2</u> Cefmetazole, Cefoperazone, Cefotetan</p> <p><u>กลุ่มที่3</u> Cefotaxime*, Cephalothin</p> <p><u>กลุ่มที่4</u> Ceftibuten, Ceftizoxime</p> <p><u>กลุ่มที่5</u> Cefuroxime, Cefoxitin</p> <p><u>กลุ่มที่6</u> Cefdinir*, Cefixime*</p>	<p><b>Antibiotics</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulfamethoxazole (Bactrim®)*</li> <li>Dapsone*</li> <li>Sulfadiazine</li> <li>Sulfacetamide</li> </ul> <p><b>Non – antibiotics</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Furosemide (lasix®)*</li> <li>Bumetanide</li> <li>Chlorthalidone</li> <li>Hydrochlorothiazide*</li> <li>Chlorothiazide</li> <li>Indapamide</li> <li>Metolazone</li> <li>Acetohexamide</li> <li>Chlorpropamide</li> <li>Glipizide*</li> <li>Glicazide</li> <li>Glimepiride</li> <li>Glibenclamide*</li> <li>Tolbutamide</li> <li>Sulfasalazine*</li> <li>Probenacid</li> <li>Celecoxib</li> <li>Sumatriptan</li> <li>Naratriptan</li> <li>Topiramate</li> <li>Ibutilide</li> <li>Sotalol</li> </ul> <p>หมายเหตุ กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยา antibiotic ในกลุ่ม sulfonamide อาจพิจารณาใช้ยา non – antibiotic ในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากอาการแพ้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้าง arylamine ที่ไม่มีอยู่ในกลุ่ม non - antibiotics</p>
<b>NSAIDs</b>	<b>Quinolones</b>	
<p><b>Salicylates</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirin*, Diflunisal</li> </ul> <p><b>Propionic acid derivatives</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ibuprofen*, Naproxen*, Fenoprofen</li> </ul> <p><b>Acetic acid derivatives</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indomethacin*, Sulindac, Diclofenac*</li> </ul> <p><b>Enolic acid (Oxicam) derivatives</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piroxicam*, Meloxicam, Tenoxicam</li> </ul> <p><b>Fenamic acid derivatives</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefenamic acid*, Flufenamic acid</li> </ul> <p><b>Sulphonanilides</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nimesulide</li> </ul> <p><b>Selective Cox – 2 inhibitors (Coxibs)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Celecoxib, Etoricoxib*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norfloxacin*</li> <li>Ofloxacin*</li> <li>Ciprofloxacin*</li> <li>Levofloxacin (Cravit®)</li> <li>Moxifloxacin (Avelox®)</li> </ul>	
	<b>Anticonvulsant</b>	
	<p><b>Aromatic ring contained</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Phenytoin*</li> <li>Phenobarbital*</li> <li>Carbamazepine*</li> <li>Lamotrigine</li> </ul> <p>หมายเหตุ ถ้าผู้ป่วยเกิดอาการ Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome (AHS) จากยาตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ ไม่ควรใช้ยาตัวใดในกลุ่มนี้อีกเลย</p>	

\* รายการยาที่มีในบัญชียาโรงพยาบาลบางละมุง